



„...új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk.
Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, a
csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás
harmóniájának megteremtése.”
(Gyórfy Béla)

A nagy termés nyomában...

Kedves NÉV, olvassa hírlevelünket!

Felhívások, közlemények

[Felhívás a ProZea Alap bővítésére](#)

[Jelentkezés termésverseny ellenőrnek](#), tanácsadónak

[Kitöltendő kérdőív a kukoricavetések állapotáról](#) a Szavazások lapon (Folyamatosan a
tenyészidő folyamán!)

[Szponzori Szabályzat](#)

Termésverseny

[Az V. Kukorica Termésverseny meghirdetése](#)

A jelentkezési határidő ma lezárul!

[Előzetes statisztika itt](#)

[Regisztráció](#) **Hogyan kell jelentkezni?** Aki már regisztrált, bejelentkezik a honlapra, aki még nem, regisztrál - a kiküldött megerősítő link segítségével megerősíti a regisztrációt -, kitölti a jelentkezési ívet (a személyes adatokat és a technológiai adatokat is), és elküldi a küldés gomb segítségével. A regisztrációs díj beérkezése után a jelentkezést elfogadjuk. Az elfogadott versenyzők adatai szerepelnek a Termésverseny oldalon megjelenő térképen. **Amennyiben nem sikerül az online regisztráció, kérjük a hagyományos módon, papír alapon (Jelentkezési ív) beküldeni a jelentkezést. Az ott lévő adatok alapján segítünk az online regisztrációban!** Miután így megoldódott a jelentkezés, a *technológiai adatokat* online ki kell tölteni az érvényes jelentkezéshez!

[Szabálykönyv](#)

[Az ellenőrzés rendszere](#)

[Ellenőrök teendői](#)

[Versenyzők teendői](#)

Top20 Fajtakísérleti és Fajtainformációs Rendszer

[A Top20 kísérleti fajtasorrend, helyek, térkép, tapasztalatok](#) - 2013.

[Június-júliusi szemlék](#)

A maglici kísérletről

Piac

[Magro.hu](#) 33. heti piaci jelentés

[USDA jelentés](#) (2013. augusztus)

Aktuális

[Rajzik a kukoricamoly](#) - nem csak rovar, de gombakártétel is keletkezhet. Különösen a második nemzedék rajzása erős. Annak ellenére, hogy a virágzást követő időszakban nem volt eső, amely felerősíthette volna a gombafertőződést, a déli régióban találhatók fertőzött állományok.

A gyapottok bagolyepke rajzása nem erősödött fel. Ha lesz is rágáskártétel, jelentősebb gombakártételt már valószínűleg nem fog kiváltani.

Tenyészdő, időjárás: Legutóbbi kiadásunk óta sem váltzott az időjárás jellege. A rekkenő hőség különösen nagy kárt okoz a késői és egyenetlen vetésekben. A legnagyobb veszteség abból származik, hogy a szemek nem tudnak megfelelően kifejlődni, sok lesz az apró és a léha szem.

Termésbecslés: Emlékeztetőül néhány gyakorlati összefüggés: 10 dkg-os átlagos cső súly mellett 10000 csővenként egy tonna termés várható. Hazánkban a termőterületek átlagában 40 - 60 000 csővel lehet számolni hektáronként. Ebből adódik, hogy az országos termésátlag általában 4-6 tonna körül alakul. A 10 tonna/ha feletti terméseket 20 dkg vagy a feletti csővenkénti produkcióval érik el. Ahhoz, hogy egy

kukorica csövön 20 dkg vagy annál is több kukorica legyen, általában 600 kifejlett szemnél többnek kell lenni. A 600 szemes csőterméshez legalább 16 sornak kell lenni egy csövön

Kelési egyenetlenség, tőeloszlás: Most úgy tűnik, az előzőnél is nagyobb veszélybe kerülhet az egyenetlenül kelt táblák növényállományának termőképessége. Nagy a valószínűsége annak, hogy a késedelmes virágzás miatt a későn kelt növények nem csak a szokásos "elfekvési" és késői kelésből eredő kiesést szenvedik el, de a rendkívüli hőség a pollen életképességét is csökkenti, rontva a termékenyülést.

(Ennek az esztendőnek - mint annyinak már korábban is - egyik emlékezetes jellemzője lesz a kelési egyenetlenség. Tipikus hiba olyankor, amikor a hosszabb tavaszi esőzések után a gazdák nagy erőket mozgósítva nekilódulnak a még kissé nyers talajon a magágy előkészítésének. A hirtelen érkező felmelegedés ilyenkor kiszárítja a megmozgatott talajréteget, s ha a magot nem teszik a nyitott magágy még nedves fenekére, s nem hengerezik vissza a talajt, hogy segítsék a talajharmatot a felső réteg visszanyirkosításában, a mag nem tud kikelni. A már előbb említett hibák (a talajlakók fellépésének megelőzése, a védekezés elhanyagolása, a magminőség hiányosságai) és az egyenetlen kelés sok felé vezettek nagyon egyenetlen fejlettségű növényállományokhoz. Az ilyen táblákon nem csak termés kieséssel, de a betakarítás során tapasztalható nagyon egyenetlen szemnedvességgel is számolni kell!)

Kukoricamoly, gyapottok bagolylepke, kukoricabogár imágó: A kukoricamoly megjelenése egyes régiókban nagy egyedi gyakoriságot mutat. Az ország délkeleti részében elvetett Top20 kísérletekben szinte minden növényben megtalálhatók a lárvák. Különösen erős a fertőzés a korai hibridekben. Közepes fertőzés szinte mindenütt észlelhető. Várható, hogy a második rajzás és az ebből származó

hernyónépeség általánosan erős lesz. A védekezés indokolt, de az igazán hatásos térségi összefogással és összehangolással lehetne. A fénycsapda (Kőszárhegy) már rendszeresen fogja a gyapottok bagolylepkét. Száraz, meleg nyarakon általában gyakoribb ez a kártevő, s a kialakuló kár is nagyobb. Megjelet a kukoricabogár imágója a nem kukorica előveteményű táblákban is. Egyes vélemények szerint a három kártevő ellen összehangolt védekezést lehet végrehajtani. Ellenkezőjét kísérleti tapasztalatokkal nem tudom alátámasztani, de az eltérő populációdinamikai tulajdonságok miatt számomra nem túl megalapozott véleménynek hangzik - már ami a várható eredményességet illeti. Annyi igazság azonban lehet benne, hogy bármikor lehet olyan permetezést végezni, amely az éppen repülő lepkéket, bogarakat és éppen a növények kívül tartózkodó hernyókat gyéríti. Azt azonban nem lehet megjósolni, hogy az ilyen "vakrepüléseknek" mekkora lehet a haszna.

Gazdaszemmel (Szieberth Dénes rovata)

[A hazai kukoricatermesztés fejlesztési lehetőségei](#) (előadás). Gazdáktól hallottam, hogy Szarvason, a Dupont-Pioneer rendezvényén kiváló, szemléletformáló előadás hangzott el egy amerikai előadótól. Érthető, s tavalyi utamon magam is tapasztaltam, hogy milyen hatalmas erőfeszítéseket tesznek a már amúgy is magas termelési szint továbbfejlesztéséért és legalább annyit a folyamat fenntarthatóságának biztosításáért. Engem a GOSZ képviselője és néhány jeles hazai gazda társaságában ugyanazon a napon egy másik cég, a Monsanto munkatársai kértek meg rövid tájékoztatóra - itt tartózkodó magas rangú cégvezetők részére - a hazai fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban. A rám vonatkozó kérésnek az itt bemutatott anyag segítségével tettem eleget..

Tengeri - szemmel (Benedek Szilveszter rovata)

[Cikkek a Getreide Magazin-ból](#) és a Progressive Farmerből a búza mikroelem trágyázásáról, a nitrogén elláttságról és a kukorica öntözéséről

A [Progressive Farmer](#) arról számol be, hogy az idei igen kellemetlen, nedves tavasz ellenére a farmerek jelentős többletmunkával nagyobb területet vetettek be a vártnál (USDA jelentésre hivatkozva, angolul)!.Hogyan regál a piac?

Cikk, kép, hozzászólás küldése: magyarkukoricaklub@me.com

Kiadja: A Magyar Kukorica Klub Egyesület; Felelős szerkesztő: dr. Szieberth Dénes

[Facebook](#)

Erre az email címre kérjük, ne válaszoljon!

Ezt a Hírlevelet Ön azért kapta, mert regisztrált a Magyar Kukorica Klub Egyesület honlapján, és bejelölte, hogy szeretne hírleveleket kapni.