

Kedves Kollégák!

Ezt a fotót Szarvasról kaptam. Panaszkodnak, hogy a kelésben lévő kukoricaszemek, csírák nagy százalékban pusztulnak. Mi tagadás, a képen is ez látszik. Kérdezik mi a kár okozója?

Ritkán, de előfordul az ilyesmi. A kárt valószínűleg a szőröslábú viráglégy, vagy babszárrontó légy nyüvei okozzák. Félő, hogy ez a jelenség Fejér megyében is előfordul.



Mint ismeretes ezek a legyek más évjáratban nem károsítják a kukoricát. Nekem "beugrott", hogy hajdan (negyedszázada) az Enyingi Állami Gazdaságban láttam ilyet. Az okát abban látom, hogy idén az egyébként báb alakban telelő legyek lényegesen korábban keltek a szokottnál. Számos helyen a kukoricavetés is korábban történt és a csírázás is beindult. Az időközben lehűlt talajokban a csíra fejlődése lelassult, vontatottá vált. A tápnövényt kereső legyek ezekre a táblákra petéztek. A kikelt nyüvek a csírázó magot és a csírákat megtámadták. (A nyű a kép jobb oldalán látható.) Ezek a legyek nem számítanak kukorica-kártevőnek, de a szükség törvényt bont. Ez a tápnövény adódott... Az okozott kár a vontatott növényfejlődés miatt egyre intenzívebb. Védekezésre megelőző módon (csávázással, vagy talajfertőtlenítéssel) lett volna lehetőség.

Szeőke Kálmán