


<h1>Top20</h1>		
<p><a href="#">Regisztrálj a XIII. Kukorica Termésversenyre!</a></p>		<p><b>Támogasd a ProZea Alapot!</b> <b>ProZea</b> <b>A Kukoricáért!</b></p>

## Májusi áttekintés

Gyors összefoglaló április 19. és május 19. között


Összeállította: dr. Szieberth Dénes

(Forrás: met.hu Agrometeorológia)



1. ábra: A 30 napos csapadék-eloszlás általában kedvező képet mutat – egyes térségekben a túlzott csapadék hullás nehézségeket okozott a tavasz munkákban


<h1>Top20</h1>		
<p><a href="#">Regisztrálj a XIII. Kukorica Termésversenyre!</a></p>		<p><b>Támogasd a ProZea Alapot!</b> <b>ProZea</b> <b>A Kukoricáért!</b></p>



2. ábra: A hőmérséklet nem mutat melegedést az áprilisban megszokotthoz viszonyítva – így várhatóan a májusi átlag is a hűvösebbek közé tartozik majd




<h1>Top20</h1>	 <b>Magyar Kukorica Klub</b>	
<p><a href="#">Regisztrálj a XIII. Kukorica Termésversenyre!</a></p>		<p><b>Támogasd a ProZea Alapot! ProZea A Kukoricáért!</b></p>



3. ábra: A legfelső talajréteg mindenütt telített, az ábrán látható 50 cm-ig jelzett telítettségi értékek arra utalnak, hogy a hiány (ahol ez mutatkozik) nincs a veszélyzónában, viszont a 100% túltelítettséget (levegőtleniséget, elvizesedést) jelezhet


<h1>Top20</h1>		
<p><a href="#">Regisztrálj a XIII. Kukorica Termésversenyre!</a></p>		<p><b>Támogasd a ProZea Alapot!</b> <b>ProZea A Kukoricáért!</b></p>



4. ábra: Az április 1-től számolt NFN sehol sem jelez gyors gyarapodást – arra utal, hogy a kukorica mindenütt lassan fejlődik




<h1>Top20</h1>		
<p><a href="#">Regisztrálj a XIII. Kukorica Termésversenyre!</a></p>		<p><b>Támogasd a ProZea Alapot!</b> <b>ProZea A Kukoricáért!</b></p>



5. ábra: Az előző évben is elmaradt a májusi foknap-gyapardás az átlagostól – a fenti ábra szintén elmaradást vetít előre

<h1>Top20</h1>		
<p><a href="#">Regisztrálj a XIII. Kukorica Termésversenyre!</a></p>		<p><b>Támogasd a ProZea Alapot!</b> <b>ProZea A Kukoricáért!</b></p>



6. ábra: A sokévi azonos időszaktól való jelentős elmaradás későbbi betakarítási szezonra utal – ha egy esetleges forró nyár mégis előre hozná az érési folyamatot, az kedvező lenne a szárítási költségek alakulása szempontjából, de ekkora hátrány minden valószínűséggel csak a termés rovására hozható be