



Top20 szemle, 2026. augusztus 18.

Makó, Békéscsaba, Lovrin

Készítette: dr. Szieberth Dénes

Tájak

- A helyszín felé tartva nem sok meglepetés ért. Az utak mellett elsuhanó táj a már elcsépeltnek számító szomorú aszályképet tükrözte, elszáradt kukoricákkal, gyenge kondícióban lévő napraforgókkal, hervadó és száradó más kultúrákkal, növényzettel. Felüdülést hozott az alföldi szikesek lellegvirágzása (*Statice gmelini*).



Top20 Kísérletek

-
- A kísérletekben meglepetés erejével hatott a makói kísérlet, ahol a hasonló, vagy még intenzívebb öntözés ellenére elmarad a 10 tonna feletti 2025-ös és 2024-es bravúr (okait nyomozom). A békéscsabai (Csabaszabadi) makóihoz hasonló várható eredmény mindössze +30 milliméteres csapadékkal következik be. A lovrini kísérlet a vártnál kiegyenlítettebb, ezért nem fog csalódást okozni, mert ugyan alacsony szintű terméssel, de megbízható különbségeket eredményezhet.

Top20 Makó

20mm	5/7/2026
25mm	6/2/2026
30mm	7/7/2026
30mm	7/22/2026

- Amint a táblázat tanúsítja, Makón négy alkalommal öntözték a kísérletet, ideális elosztásban. A kijuttatás hasonló volt a 2023. évihez. Így meglepett, hogy az eredmény, a 10 t/ha körüli termés elmarad. Helyette, az elvégzett számszerű becslés szerint, 5 tonna körüli mutat. Kérdés, hogy az előző évihez viszonyított műtrágya takarékoság (100 vs. 40 kg/ha N h.a.) milyen mértékig játszhatott ebben szerepet. Ha igen, nem valószínű, hogy helyes volt a kísérletnek helyet adó gazda döntése!



Top20, Makó, 130, 1001

Koraiak, 1. ismétlés, 1. parcella

(A csöveken itt-ott vélhetően bibecsatornás
szemfertőzés látható – *F. verticillioides*?)



Makó, 140, 1001

Középérésűek, 1. ismétlés, 1.
parcella

A photograph of corn plants with green leaves and yellow ears. The image is used as a background for the text. The right side of the image is faded to provide space for the text.

Top20, Makó

A hosszabb tenyészidejű
hibridek között még
nagyobb szemnedvesség
tartalmúak is találhatóak.

Békéscsaba (Csabasabadi)

- A „Békécsaba” jelzésű, de Csabasabadi határában elvetett kísérleti terület 30 mm, a szélesebb értelemben vett tájegységre nem jellemző csapadéknak köszönhetően megmenekült a Délkelet-Magyarországon jellemző teljes megsemmisüléstől. A kísérlet maga a jelenleg róla alkotott kép szerint kiegyenlítettnek tekinthető, a parcellák mért eredményei várhatóan tükrözik majd a beléjük vetett hibridek adott körülmények közötti teljesítőképességét.





Top20 Békéscsaba, 130, 1001

Koraiak, 1. ismételés, 1 pozíció.



Top20 Békéscsaba, 140, 1001

Középérésűek, 1. ismételés, 1.
pozíció



Top20 Békéscsaba

- Ennek a fiatal gyapottok bagolylepke hernyónak már nem sok esélye van a túlélésre!



Lovrin

- A romániai Temes megyében, ha Kiszombor felől közelítünk Nagyszentmiklós és Temesvár között fekvő város határában elvetett kísérlet. Kultúrállapota jó, gyom és kártétel mentes. A növények nem erősek, de a csőképződés megtörtént. A szárazság, az Alföld más kukoricásaihoz hasonlóan, erősen sújtotta. A csövek berakódási hiányában és torzulásában megnyilvánuló stresszhatás erősen hibridfüggő, alacsony szinten (2,5 – 5,5 t/ha), de jelentős terméskülönbségek várhatók. Egyes hibridek szárában ott lapul a fómás korhadás, megkésett betakarítás esetén szártörést is okozhat.



Top20 Lovrin, 130, 1001

Koraiak, 1. ismételés, 1. pozíció



Top20 Lovrin, MK140, 1001

Középérésűek, 1. ismétlés, 1.
parcella

Lovrin

- A fómás korhadás megkésett betakarítás és/vagy közbejött vihar esetén egyes hibrideknél szártörést is okozhat!

