

A „Kukoricatermés 2026” kérdőív eddig beérkezett adatainak értékelése

Készítette: dr. Szieberth Dénes

A táblázat exportálásakor kiderült, hogy valaki szórakozott! Mintegy 100 adat „kamu” volt. Örülök, hogy valaki a honlapunkat szórakoztatónak tartja, bár a magam részéről el is tekintenék tőle! Annyi egyéb szórakozási lehetőség adódik az interneten – ha kérhetem, inkább ott szórakozzanak!

(A közösségi média nagyon hasznos is lehetne, ha nem az ilyen jelenségek miatt tartózkodnánk sokan a használatától! Számos külföldi és hazai becslés szerint a hozzászólások 80–90%-a irreleváns vagy éppen... – inkább nem mondok jelzöt!)

Végül is egy mozdulattal sikerült megszabadulnom a nem kívánt oszlopoktól, és elvégezni az elemzést. Azt még megjegyzem, hogy az adatok így nem reprezentatívak – mint ahogy az értékelhetetlen tartalmú oszlopokkal sem lettek volna azok –, viszont az információ az információ, és a következtetéseket mindenki levonhatja a saját ízlése szerint.

Nekem a számok (és a külön táblázatba foglalt megjegyzések) azt üzenik, hogy a valóban rendkívüli aszályos körülmények között az öntözésnek akár 10 tonnás hatása is lehetett. Ha valamikor, most megérte szakszerűen öntözni! Következtetésem az eddig betakarított termésversenyparcellák adatai megerősítik!

A beérkezett adatsort nem véleményezem, de a szavazófelületet nyitva hagyom. Azt remélem, hogy még elegendő adat érkezik a területveszteségek és a valós termésátlagok országos eloszlásának megítéléséhez. A további kitöltési szándék erősítése érdekében az értékelést kiegészítettem a NAK által közreadott adatokból készített térképpel (1. ábra). Örömmel venném, ha ehhez is kapnék megjegyzéseket! Biztatásul a saját felmérés térképét is bemásoltam (2. ábra).

A részletek:

Az 1. táblázat név nélkül, csak a származási hely (vármegye) feltüntetésével mutatja be az adatokat. A termésátlagot és a betakarított termés nedvességtartalmát az öntözött területek nélkül külön sor mutatja.

1. táblázat: A beérkezett adatok statisztikája

Vármegyék	Összes vetésterület (ha)	Öntözött terület (ha)	Kijuttatott öntözővíz (mm)	Szemesként betakarított terület (ha)	Csapadék január 1. és szeptember 1. között (mm)	Terméshozam (t/ha, legalább 1 tizedesjegy)	Betakarításkori víztartalom (%)
Hajdú-Bihar	63	0	0	36	150	1,5	12
Baranya	7	0	0	7	380	7	15
Jász-Nagykun-Szolnok	89	89	160	89	132	10,06	13,2
Bács-Kiskun	85	0	0	63	210	1,5	12
Tolna	1400	0	0	265	247	2,4	13

Vármegyék (folytatás)	Összes vetésterület (ha)	Öntözött terület (ha)	Kijuttatott öntözővíz (mm)	Szemesként betakarított terület (ha)	Csapadék január 1. és szeptember 1. között (mm)	Terméshozam (t/ha, legalább 1 tizedesjegy)	Betakarításkori víztartalom (%)
Szabolcs-Szatmár- Bereg	250	0	0	250	227	4	15
Bács-Kiskun	15	0	0	15	251,7	3,2	12
Tolna	60	0	0	15	210	2,8	11
Tolna	60	0	0	20	178	2,7	11
Tolna	60	0	0	20	175	2,7	11
Győr-Moson-Sopron	25	0	0	25	210	3,3	12,1
Pest	117	0	0	117	80	1,5	11
Vas	235	0	0	235	210	3,4	14,5
Csongrád-Csanád	13	0	0	13	210	1,05	12
Összesen / átlag*	2479			1170	205	3,42	13,33
Maximumérték	1400			265	380	10,06	15,00
Minimumérték	7			7	80	1,05	11,00
Öntözés nélkül						2,87	13,35

Megjegyzések vármegyéenként

Fontosak azok a megjegyzések, amelyek az okokra is rávilágítanak, illetve a technológiára utalnak. A hibridek forgalomba hozójára való utalásnak kisebb az információértéke, mint a hibridnevek közlésének. Jóllehet azt is tudjuk, hogy az öntözés hatásának összehasonlító megítéléséhez ugyanazoknak a hibrideknek az öntözés nélküli adatai is szükségesek.


2. táblázat: Megjegyzések – szintén az anonimitás megtartásával

Vármegye	Megjegyzés
Bács-Kiskun	A szója után vetett, 6 ha-os táblán az átlagtermés meghaladta a 3,0 t/ha-t.
Csongrád-Csanád	Vetési tőszám: 45 000 mag/ha.
Győr-Moson-Sopron	Az adatok öt, eltérő adottságú területről származnak.
Hajdú-Bihar	Véget ér a hét szűk esztendő.
Jász-Nagykun-Szolnok	DKC és PIO hibridek; vetési tőszám: 75 000 tő/ha.
Szabolcs-Szatmár-Bereg	A betakarítás még folyamatban van.
Tolna	Magas nyári UV-terhelés. Rendkívül gyenge eredmény.


2. táblázat: Az adatok megyei összesítése

Vármegye	Adatsorok száma	Vetett terület összesen (ha)	Öntözött terület összesen (ha)	Átlagosan kijuttatott víz (mm)	Betakarított terület összesen (ha)	Átlag csapadék (mm)	Súlyozott termésátlag (t/ha)	Súlyozott víztartalom (%)
Hajdú- Bihar	1	63	0	0	36	150	1,50	12,00
Baranya	1	7	0	0	7	380	7,00	15,00
Jász- Nagykun- Szolnok	1	89	89	160	89	132	10,06	13,20
Bács- Kiskun	2	100	0	0	78	231	1,83	12,00
Tolna	4	1580	0	0	320	203	2,46	12,66
Szabolcs- Szatmár- Bereg	1	250	0	0	250	227	4,00	15,00
Győr- Moson- Sopron	1	25	0	0	25	210	3,30	12,10
Pest	1	117	0	0	117	80	1,50	11,00
Vas	1	235	0	0	235	210	3,40	14,50
Csongrád- Csanád	1	13	0	0	13	210	1,05	12,00

Fontos lenne folytatni a kérdőív kitöltését ahhoz, hogy az adatok reprezentatívak legyenek, és a NAK adataihoz hasonló, azokkal összevethető vármegyei terméstérkép készülhessen!



1. ábra: Magyarország várható kukorica-termés-átlaga az ösztérület betakarításának kb. 75%-ánál (Forrás: NAK)



2. ábra: Magyarország kukoricatermés-térképe a beérkezett adatok alapján (Forrás: www.magyar kukoricaklub.hu)