KUKORICA BAROMÉTER

Magyar Kukorica Klub

„…új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk. Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, a csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás harmóniájának megteremtése.”

(Győrffy Béla)

A nagy termés nyomában...

A www.magyarkukoricaklub.hu honlapunk Hírek oldalán a betakarítás ütemének megfelelően tájékoztatást adunk a X. Kukorica Termésverseny pillanatnyi állásáról, s röviden összefoglaljuk a tapasztalatokat. Legújabb tájékoztatónk ITT tölthető le.

Előzmény

Versenyprogram

Versenytérkép

Rekord-cső verseny:

Még nem érkezett be jelentkezés a Rekord cső versenyre, pedig az eddig mért nagy termésekből feltételezhető, hogy találhatók lennének igazán nagy kukoricacsövek! A versenykiírás szerint begyűjtött csövek környezetének tanulmányozása vezethet el az igazán nagy termések eléréséhez. Ne feledkezünk meg a fejlődés törvényszerű következményéről: **"Ami ma kiváló, az holnap átlagos."**

Az eddig elvégzett termésbecslések tapasztalatai:

A korábbi évekhez viszonyítva sokat javult a beküldött termésbecslések minősége. (Kevesebbet kell megismételni amiatt, hogy csak egy mintából származik, vagy láthatóan íróasztal mellet készült.) Az is igaz, ellenőreink, hogy biztosítsák a jobb előkészítést és nyugodtabb szervezést, telefonon megkeresik a versenyzőket és kérik a betakarítás ütemezésére, egyúttal a termésbecslés elvégzésére.

A Magyar Kukorica Klub felajánlja a becslés elvégzését! Ezt a szolgáltatást a kiszállási költségek megtérítése ellnében tudjuk vállalni.

Fuzárium bemutató:

A csapadékos délelőtt miatt nem lehetett kimenni a kísérleti területre, ennek ellenére sikeres volt a hétfői fuzárium bemutató. A kapcsolódó híradás ITT olvasható.

Gondoltál rá? A kintlévő kukorica most már folyamatosan veszít a termés minőségéből és mennyiségéből!

Minőségi veszteségek:

- A gombás betegségek nyomán növekszik a toxintartalom
- Megrepedezik a maghéj és a szemek befertőződnek állategészség-ügyileg káros mikroszervezetekkel, rontják a hasznosulást
- A csapadék, köd és pára hatására a szemek "kilúgozódnak", beltartalmi veszteség lép fel, csökken a tápérték

Mennyiségi veszteségek:

- Törés-dőlés következtében bekövetkező betakarítási veszteség - az augusztus száraz volt, a szár nem tudott kellően megerősödni, ezért hamarabb válik törékennyé, kukoricabogaras táblában a felázott talajon, intenzív esőzés nyomán a szél kidöntheti a kukoricát
- Sok helyen a molyfertőzés is erős volt, amely a fuzáriumos szárkorhadásból eredő törést, csőhullást fokozhatja
- A meggyengült kocsányok elengedhetik a csövet, azok lehullhatnak a földre - egyes fajták különösen érzékenyek lehetnek
- A csőtörő adapter leveri a csövet, vagy a törés során a cső kipattan, s a földre hullik
- A túlérett cső könnyen lemorzsolódik: amikor a törőléc megüti a kibomlott csövet, a szemek egy része szétfröccsen és a földre hullik
- A törékennyé vált, túlszáradt szemek a betakarítás és anyagmozgatás során törnek, porladnak
- Tolvajok és vadak dézsmálhatják a terményt

Kiadja: A Magyar Kukorica Klub Egyesület; Felelős szerkesztő: dr. Szieberth Dénes

Facebook

Erre az email címre kérjük, ne válaszoljon!

Ezt a Hírlevelet Ön azért kapta, mert regisztrált a Magyar Kukorica Klub Egyesület honlapján, és bejelölte, hogy szeretne hírleveleket kapni.